

شدة المرض على عدد الأرباع التي طالها المرض وبأي مستوى . تظهر الأوعية الدموية في مرحلة مبكرة من المرض تغيرا طفيفا في المسماك، ويمكن رؤية نزف بسيط جدا .

مرض السكري المبكر للعين

[illegible] متقدمة أن تبدأ الأوعية الدموية غير الطبيعية [illegible]طور عند القرص البصري أو في جزء آخر، وإذا [illegible]الج يمكن أن تبدأ في النزف في تجويف العين مسببة هبوطا كبيرا في الرؤية.

اعتلال الشبكية المتقدم بسبب السكري

العيون التي لم يتم علاجها يمكن أن [illegible]

ويمكن علاج المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية باستخدام الليزر مع أو بدون علاج داخلي للبقعة .

ويمكن للعلاج الجراحي أن ينقذ الرؤية في الوقت الذي تفشل فيه الطرق التقليدية في إيقاف تطور المرض .

يمكن أن تجرى معظم العمليات الجراحية للشبكية هذه الأيام تحت التخدير الموضعي بدون الحاجة إلى المبيت بالمستشفى .

[illegible]

الرؤية بسبب داء السكري إلى حد كبير والحفاظ على نوعية الحياة ، وايضا تقليل التأثير المالي على الأفراد والحكومات .